

Вопросники по профессии врача.

1. Раньше всего при шоке появляется ...?
2. Как оценивается эффективность введенной дозы атропина?
3. Что является причиной синдрома раздраженной кишки?
4. Оптимальный комплекс препаратов для лечения сердечной недостаточности I стадии.
5. Симптомы ревматоидного артрита, развивающийся позже остальных.
6. Признаки недостаточности митрального клапана аускультативно.
7. Наиболее эффективный препарат для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии (препарат выбора).
8. Тактика врача общей практики при впервые возникшей стенокардии.
9. Больному 65 лет. Рост 160 см, масса тела 105 кг. Жалоб не предъявляет. Уровень глюкозы в крови натощак - 6,2 ммоль/л. Выберите тактику ведения данного пациента.
10. Показания к назначению тюбажей.
11. Для локализованной дифтерии глотки характерно...?
12. Укажите показания для трахеотомии...?
13. Основное действие нитратов при лечении стенокардии состоит в ...?
14. По какой формуле вычисляется Индекс массы тела?
15. Какие методы исследования надо провести чтобы диагностировать ВИЧ?
16. Какое значение АД НАИБОЛЕЕ вероятно соответствует тяжелой степени артериальной гипертензии?
17. Препараты первого ряда для снижения холестерина.
18. При эмфиземе легких дыхание ...?
19. Крепитация характерна для ...?
20. Обмороки при физической нагрузке наиболее характерны для больных с:
21. Печеночная кома развивается в результате...?
22. Какие лечения применяются хронического панкреатита в фазе ремиссии?
23. Наиболее точно отражает степень хронической почечной недостаточности повышение в сыворотке крови уровня ...?
24. На 20-й день инфаркта миокарда у пациента возникла боль в груди, повышение температуры тела, шум трения перикарда, в клиническом анализе крови - увеличение СОЭ. Наиболее вероятно – это ...?
25. Наиболее частой причиной спонтанного пневмоторакса служит ...?
26. Наиболее точно отражает степень хронической почечной недостаточности повышение в сыворотке крови уровня это ...?
27. Наименьшее количество крови при кровотечениях верхних отделов желудочно-кишечного тракта, при которой появляется мелена?
28. Что является клиническим признаком, позволяющим заподозрить менингит?
29. К вероятным признакам беременности относятся?
30. Началом родов следует считать?
31. Место наилучшего выслушивания двухстворчатого (митрального) клапана.
32. Этика медицинских работников это?

33. Что является ведущим симптомом хронического бронхита с преимущественным поражением слизистой оболочки крупных бронхов?
34. С помощью чего выявляется Бронхиальная обструкция?
35. Что является основным признаком левожелудочковой сердечной недостаточности?
36. Какой симптомокомплекс соответствует Вирусному гепатиту?
37. Что является самым важным в дифференциальной диагностике между язвенной болезнью и раком желудка?
38. Что является следствием хронической почечной недостаточности (ХПН)?
39. Механизм действия антигистаминных препаратов.

40. Что показано применять при анафилактическом шоке?
41. Что является при развитии анафилактического шока наиболее эффективным препаратом для неотложной терапии?
42. Как следует осуществлять транспортную иммобилизацию при переломах бедра?
43. Что такое "мелена"?
44. Какой тип диабета чаще встречается у подростков?
45. Что служит для наиболее частой причиной спонтанного пневмоторакса?
46. Во время эпидемии гриппа молодой человек 17 лет, в прошлом применявший внутривенные наркотики, пожаловался на головную боль, ломоту в теле, недомогание, светобоязнь при пробуждении. Температура тела 37,3°C, напряжение затылочных мышц. Врач порекомендовал постельный режим, обильное питье, прием панадола. Через 12 часов присоединились тошнота и головная боль. Больной был очень сонным. Дежурный врач, приехавший по вызову, госпитализировал больного. Какой вероятный диагноз?
47. Какой признак является наиболее характерным при поражении наружного уха?
48. Что характерно для Альбуминурия и гипопроteinемия в сочетании с цилиндрурией и отеками?
49. Что является клиническим признаком хронического панкреатита?
50. Какая диета требуется у больных с обострением панкреатита?
51. Какой наиболее характерный симптом при Лейкоцитурия?
52. Что характеризуют острый нефритический синдром?
53. Что является ведущим клиническим признаком нефротического синдрома?
54. Что является наиболее эффективным методом профилактики обострения полиноза?
55. Как можно обеспечить максимальную продолжительность жизни больных циррозом печени?
56. Профилактическое лечение больных с язвенной болезнью.
57. У какого органа наиболее часто возникает асцит при злокачественной опухоли?
58. Что можно отнести к предраку желудка?
59. Какие признаки можно отнести к "сигналам тревоги" рака молочной железы?

60. Какие группы женщин чаще поражаются раком шейки матки?
61. Какие признаки, наиболее характерный для нарушенной внематочной беременности?
62. Что из нижеперечисленного является признаком заболевания сердца во время беременности?
63. Мужчина 27 лет внезапно почувствовал боль в эпигастрии и в правом подреберье. Через несколько часов боль стала меньше. Объективно: язык сухой, живот втянут, мышцы брюшной стенки напряжены. АД 90/60 мм рт. ст., пульс 120 уд./мин. Предположительный диагноз...?
64. В каких случаях может возникать боль в груди?
65. Какие признаки встречаются при врожденных пороках сердца?
66. Механизм действия антигистаминных препаратов.
67. Что следует применить для временной остановки кровотечения при ножевом ранении сонной артерии?
68. Какой минимальный уровень гликемии натощак, по которому диагностируется сахарный диабет?
69. Что является наиболее информативным методом диагностики гипертрофической кардиомиопатии?
70. У женщины 33 лет, курящей, третий раз в течение года возникает очаговая пневмония с локализацией в S9. В период между заболеваниями беспокоит повышенная утомляемость, кашель, бывает мокрота с прожилками крови. Каков диагноз?
71. Что указывает на тампонаду сердца?
72. У молодой женщины при профилактическом осмотре выявлено повышение АД до 160/90 мм рт. ст. Жалобы на периодическую головную боль. В анализах мочи патологии не выявлено. На ЭКГ: неспецифические изменения сегмента ST. В течение 10 лет принимает оральные контрацептивы. Вероятнее всего, повышение АД вызвано:
- Артериальной гипертензией.
 - Приемом оральных контрацептивов.(+)
 - Нейроциркуляторной дистонией.
 - Беременностью, возникшей вследствие неэффективности оральной контрацепции.
 - Электролитными нарушениями.
73. 65-летний мужчина вызвал врача общей практики по поводу внезапно появившейся боли и парестезии в правой ноге. При объективном осмотре правая стопа и голень бледная, бледность нарастает при подъеме ноги. Пульсация на тыльной артерии правой стопы отсутствует. С чем эти симптомы связаны?
74. Что включает в себя механизм действия нитратов?
75. У больной В., 37 лет в ранние предутренние часы появляются интенсивные давящие боли за грудиной. Днем хорошо переносит большие физические нагрузки. При коронароангиографии выраженных атеросклеротических изменений не выявлено, проба с эргометрином положительна. Каков диагноз?
76. Что является причиной значительного расширения абсолютной тупости сердца?

77. Какова норма уровня сахара в крови при поведении теста на толерантность к глюкозе?
78. Что следует для уменьшения риска развития толерантности к нитратам?
79. Каким путем расширяет бронхи Альбутамол (вентолин)?
80. Как более выражена симптоматика при пролапсе митрального клапана аускультатива?
81. Что является наиболее неблагоприятным при прогнозе заболевания у больных ИБС?
82. Что считается средством первого выбора для лечения частой желудочковой экстрасистолии в остром периоде инфаркта миокарда?
83. У молодой женщины 18 лет после эмоционального стресса появилась дисфагия при употреблении жидкой холодной или горячей пищи (плотная пища проходит хорошо). Дисфагия появилась в дальнейшем при волнении, усталости. Аппетит сохранён, в весе не теряла. При физикальном обследовании патологии не выявлено. Что следует больному рекомендовать?
84. Что является достоверным клиническим признаком стеноза привратника?
85. К чему приведет при диетотерапии язвенной болезни включение белковых пищевых продуктов при дробном питании?
86. При желчнокаменной болезни имеет место:
- снижение соотношения желчных кислот и холестерина. (+)
 - снижение уровня билирубина желчи.
 - повышение уровня желчных кислот.
 - повышение уровня лецитина.
 - снижение уровня белков желчи.
87. Что рекомендуется при обострении неспецифического язвенного колита?
88. Как развивается почечная недостаточность при подостром гломерулонефрите?
89. 50-летняя больная жалуется на упадок сил и боли в позвоночнике, уровень гемоглобина в крови 65 г/л, протеинурия 22 г, уровень альбуминов сыворотки 40 г/л. Какой наиболее вероятный диагноз?
90. В чем состоит решающее отличие злокачественной опухоли от доброкачественной?
91. Каков обязательный лабораторный признак мегалобластной анемии?
92. Что может являться наиболее вероятной причиной глубокой гиперхромной анемии?
93. Что является характерным признаком В12-дефицитной анемии?
94. Что является наиболее типичным для псориатического артрита?
95. Какой ритм непрямого массажа сердца у взрослых?
96. Что имеет решающее значение в диагностике менингита?
97. Молодой человек без сознания на улице в крайне тяжелом состоянии. При осмотре телесных повреждений нет. Кожные покровы с выраженным цианозом, по ходу вен на руках следы от инъекций. Дыхание редкое, поверхностное. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 70 в мин, АД 90/60 мм рт. ст. Каков ваш предварительный диагноз?

98. При купировании приступа бронхиальной астмы у больного 63 лет были применены ингаляции сальбутамола, после чего у больного наступило незначительное улучшение, однако одышка и свистящие хрипы сохранились. Какой препарат необходимо ввести больному?

99. Какие симптомы типичны для обострения язвенной болезни?

100. Что характерно при отсутствие печеночной тупости при тупой травме живота?